

Інструкція для медичного застосування: інформація для пацієнта

Іновокс Експрес зі смаком м'яти, 2 мг + 0,6 мг + 1,2 мг, ледянники
Лідокаїну гідрохлорид + амільметакрезол + 2,4-дихлорбензиловий спирт

Уважно прочитайте цю інструкцію, перш ніж приймати засіб, оскільки вона містить важливу для вас інформацію.

Завжди використовуйте цей засіб точно згідно з інструкцією з упаковки, або відповідно до вказівок лікаря, фармацевта або медичної сестри.

- Зберігайте цю інструкцію, можливо, вам доведеться прочитати її ще раз.
- Якщо вам потрібна порада або додаткова інформація, зверніться до свого фармацевта.
- Якщо у вас виникли будь-які побічні ефекти, зокрема будь-які побічні ефекти, не зазначені в цій інструкції, зверніться до лікаря, фармацевта або медсестри. Див. пункт 4.
- Якщо через 2 дні не настає покращення або пацієнт відчуває погіршення, зверніться до лікаря.

Зміст інструкції

1. Фармакологічні властивості та показання для застосування препарату Іновокс Експрес з м'ятним смаком
2. Важлива інформація щодо застосування препарату Іновокс Експрес з м'ятним смаком
3. Особливості застосування препарату Іновокс Експрес з м'ятним смаком
4. Можливі побічні реакції
5. Умови зберігання препарату Іновокс Експрес з м'ятним смаком
6. Вміст упаковки та інша інформація

1. Фармакологічні властивості та показання для застосування препарату Іновокс Експрес з м'ятним смаком

Іновокс Експрес з м'ятним смаком містить антисептики – амільметакрезол і 2,4-дихлорбензиловий спирт та місцевий анестетик для горла – лідокаїну гідрохлорид. Препарат показаний для місцевого антисептичного лікування запалення (почервоніння, набряку) горла та ротової порожнини, а також для полегшення симптомів болю у горлі при цих станах.

Полегшує симптоми болю в горлі.

Іновокс Експрес з м'ятним смаком призначений для дорослих та підлітків старших за 12 років. Якщо через 2 дні не настає покращення, або пацієнт відчуває погіршення, зверніться до лікаря.

2. Важлива інформація щодо застосування препарату Іновокс Експрес з м'ятним смаком

Протипоказання щодо застосування препарату Іновокс Експрес з м'ятним смаком

- Якщо у вас алергія на лідокаїну гідрохлорид або інші амідні місцеві анестетики, амільметакрезол, 2,4-дихлорбензиловий спирт або будь-які інші інгредієнти цього препарату (перелічені в пункті б).
- Цей препарат не слід застосовувати дітям віком до 12 років.

Попередження та заходи безпеки

Порадьтеся зі своїм лікарем, фармацевтом або медсестрою перед використанням Іновокс Експрес з м'ятним смаком.

Будь ласка, повідомте свого лікаря, якщо:

- у вас астма,
- симптоми не зменшуються через 2 дні застосування або якщо у вас з'являється лихоманка, головний біль, нудота, блювота або висипання на шкірі.

Препарат може бути шкідливим для зубів.

- Анестетики в цьому препараті можуть стати причиною захлинання (кашлю під час їжі або відчуття задухи) під час їжі. Не слід їсти відразу після застосування препарату.
- Препарат може викликати оніміння язика і збільшити ризик вкусити себе. Тому будьте обережні під час вживання гарячої їжі та напоїв.
- Тривале застосування (більше 5 днів) не рекомендується, оскільки воно може змінити природну флору в горлі.
- Дотримуйтесь рекомендованого дозування: при прийомі у високих дозах або протягом тривалого часу препарат може впливати на серце або нервову систему та викликати судоми.
- Особи похилого віку або ослаблені особи більш чутливі до можливих побічних ефектів і повинні проконсультуватися з лікарем, перш ніж приймати цей препарат.
- Препарат не можна використовувати, якщо в роті та горлі є значні незагоєні рани.

Діти та молодь

Не рекомендується застосування засобу дітям віком до 12 років.

Препарат Іновокс Експрес з м'ятним смаком та взаємодія з іншими ліками

Повідомте лікаря або фармацевта про всі препарати, які приймає або нещодавно приймав пацієнт, а також про препарати, які пацієнт збирається приймати.

Зокрема, повідомте свого лікаря або фармацевта, якщо ви приймаєте будь-які із перерахованих нижче ліків, оскільки може знадобитися коригування дози:

- бета-блокатори (застосовуються для лікування серцевої недостатності або захворювання артерій) або препарати, що містять циметидин (застосовуються для лікування виразки шлунка),
- інші місцеві анестетики (амідні),
- препарати для лікування серцевих захворювань, такі як мексилетин або прокаїнамід,
- препарати, такі як флувоксамін (використовується для лікування депресії),
- антибіотики, такі як еритроміцин або ітраконазол.

Хоча не повинна виникнути жодна взаємодія, не приймайте інші орофарингеальні антисептики під час використання препарату Іновокс Експрес з м'ятним смаком.

Застосування препарату Іновокс Експрес з м'ятним смаком з їжею, напоями та алкоголем

Не слід приймати цей препарат перед вживанням їжі або напоїв.

Вагітність і період годування груддю

Вагітність:

Не рекомендується приймати цей препарат у період вагітності.

Годування груддю:

Не рекомендується приймати цей препарат у період годування груддю.

Керування транспортними засобами та експлуатація інших механізмів

Цей препарат, який застосовується в рекомендованих дозах, не має впливу або має незначний вплив на здатність керувати автомобілем та іншими механізмами.

Препарат Іновокс Експрес з м'ятним смаком містить глюкозу та сахарозу.

В одному льодянику міститься 1,016 г глюкози та 1,495 г сахарози. Це слід враховувати хворим на цукровий діабет. Якщо у вас була діагностована непереносимість деяких цукрів, проконсультуйтеся з лікарем перед прийомом препарату.

Препарат Іновокс Експрес з м'ятним смаком містить натрій.

Препарат містить менше 1 ммоль (23 мг) натрію у кожному льодянику, тобто вважається, що препарат «не містить натрію».

Препарат Іновокс Експрес з м'ятним смаком містить терпени, що містяться в левоментолі. Занадто високі дози терпенів можуть призвести до неврологічних ускладнень, таких як судоми у дітей.

3. Особливості застосування препарату Іновокс Експрес з м'ятним смаком

Дотримуйтесь вказівок, що містяться в цій інструкції. Завжди приймайте цей препарат згідно із вказівками лікаря або фармацевта. У разі виникнення будь-яких сумнівів, зверніться до лікаря або фармацевта.

Рекомендовані дози:

– Дорослі та підлітки віком від 12 років: повільно розсмоктувати по одному льодянику в роті кожні 2-3 години; використовувати до 8 льодяників на 24 години для дорослих (максимум 4 льодяники для підлітків).

Не кладіть льодяник між яснами і щокою.

Якщо через 2 дні не настає покращення або пацієнт відчуває погіршення, зверніться до лікаря. Не рекомендується використовувати цей препарат понад 5 днів, оскільки він може змінити природну флору в горлі.

Застосування у дітей

Не застосовуйте засіб дітям віком до 12 років.

Передозування препаратом Іновокс Експрес з м'ятним смаком

Симптоми, які можуть виникнути у разі неправильного застосування або передозування: надмірна анестезія верхніх відділів шлунково-кишкового тракту та дихальних шляхів, безсоння, неспокій, збудження, пригнічення дихання. Також може виникнути метгемоглобінемія, симптоми якої можуть включати задишку, головний біль, втому, непереносимість фізичних навантажень, запаморочення та втрату свідомості. Негайно зверніться до лікаря або до токсикологічного відділення, повідомивши їм назву ліків і дозу, яку ви прийняли.

Якщо у вас виникли додаткові запитання щодо застосування цього засобу, зверніться до свого лікаря, фармацевта або медсестри.

4. Можливі побічні реакції

Як і всі лікарські препарати, цей засіб може викликати побічні реакції, хоча вони виникають не у всіх.

Під час застосування препарату з комбінацією діючих речовин у цьому препараті повідомлялося про наступні побічні ефекти:

Припиніть приймати препарат Іновокс Експрес з м'ятним смаком та негайно зверніться до лікаря, якщо у вас з'являться такі симптоми ангіоневротичного набряку, як:

- набряк обличчя, язика або горла,
- проблеми з ковтанням,
- кропив'янка та утруднене дихання.

Рідко (можуть виникати рідше, ніж в 1 з 1000 пацієнтів): реакції гіперчутливості (печіння, свербіж), ангіоневротичний набряк, відчуття печіння в горлі та неприємний смак.

Повідомлення про побічні реакції:

Якщо у Вас виникли будь-які побічні ефекти, зокрема будь-які побічні ефекти, не зазначені в цій інструкції, зверніться до лікаря, фармацевта або медсестри. Про побічні реакції можна повідомити безпосередньо Департаменту моніторингу побічних ефектів медичних препаратів Управління з реєстрації лікарських засобів, виробів медичного призначення та біоцидних препаратів

Ал. Єрозолімські, 181С, 02-222 Варшава,

Тел: + 48 22 49 21 301, Факс: + 48 22 49 21 309

Веб-сайт: <https://smz.ezdrowie.gov.pl>

Про побічні реакції також можна повідомити відповідальному суб'єкту.

Завдяки повідомленню про побічні реакції можна буде отримати більше інформації про безпеку застосування цього лікарського засобу.

5. Умови зберігання препарату Іновокс Експрес з м'ятним смаком

Зберігайте препарат у недоступному для дітей місці і поза полем зору дітей.

Не використовуйте цей засіб після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці після аббревіатури «EXP». Термін придатності означає останній день зазначеного місяця.

Не зберігайте при температурі понад 30°C.

Лікарські засоби не слід викидати до каналізації або у контейнери для побутових відходів. Запитайте свого фармацевта, яким чином можна утилізувати ліки, які більше не потрібні. Таке поводження допоможе захистити навколишнє середовище.

6. Вміст упаковки та інша інформація

Склад препарату Іновокс Експрес з м'ятним смаком:

Діючі речовини: лідокаїну гідрохлорид, амілметакрезол, 2,4-дихлорбензиловий спирт.

Кожен льодяник містить:

Лідокаїну гідрохлориду моногідрату 2 мг, 2 мг,

Амілметакрезол 0,6 мг,

2,4-дихлорбензиловий спирт 1,2 мг.

Допоміжні речовини:

Олія м'яти польової зі зниженим вмістом ментолу,

Олія бадьяну,

Левоментол,

Індигокармін (Е 132),

Хіноліновий жовтий (Е 104),

Сахарин натрію (Е 954),

Винна кислота (Е 334),

Сахароза,

Рідка глюкоза.

Лікарська форма Іновокс Експрес з м'ятним смаком та вміст упаковки

Іновокс Експрес з м'ятним смаком – це двоопуклі, циліндричні льодяники зеленого кольору діаметром 19 мм, з м'ятним смаком.

Льодяники упаковані в блістери з ПВХ/ПВДХ/алюмінію.

Упаковка містить 12, 24 або 36 льодяників.

Відповідальний суб'єкт:

US Pharmacia sp. z o.o. вул. Зембіцька, 40, 50-507 Вроцлав.

Виробник:

LOZY'S PHARMACEUTICALS S.L.

Campus Empresarial s/n,

31795 Lekaroz Navarra, Іспанія

US Pharmacia Sp. z o.o.,

вул. Зембіцька, 40,

50-507 Вроцлав

Для отримання детальнішої інформації слід звернутися до:

USP Zdrowie sp.z o.o., вул. Полечкі, 35, 02-822 Варшава, тел.+48 (22) 543 60 00.

Цей лікарський засіб дозволено для продажу в країнах-членах Європейської економічної зони під такими назвами:

Польща: INOVOX Express smak miętowy

Болгарія: INOVOX Express mint flavor

Литва: Inovox menthol 2 mg /0,6 mg /1,2 mg kietosios pastiles

Дата останнього оновлення інструкції: липень 2022