

Інструкція для медичного застосування: інформація для пацієнта

Іновокс Експрес з апельсиновим смаком

2 мг + 0,6 мг +1,2 мг, ледяники

Лідокаїну гідрохлорид + амілметакрезол + 2,4-дихлорбензиловий спирт

Уважно прочитайте цю інструкцію, перш ніж приймати засіб, оскільки вона містить важливу для вас інформацію.

Завжди використовуйте цей засіб точно згідно з інструкцією з упаковки, або відповідно до вказівок лікаря, фармацевта або медичної сестри.

- Зберігайте цю інструкцію, можливо, вам доведеться прочитати її ще раз.
- Якщо вам потрібна порада або додаткова інформація, зверніться до свого фармацевта.
- Якщо у вас виникли будь-які побічні ефекти, зокрема будь-які побічні ефекти, не зазначені в цій інструкції, зверніться до лікаря, фармацевта або медсестри. Див. пункт 4.
- Якщо через 2 дні не настає покращення або пацієнт відчуває погіршення, зверніться до лікаря.

Зміст інструкції

1. Фармакологічні властивості та показання для застосування препарату Іновокс Експрес з апельсиновим смаком
2. Важлива інформація, з якою слід ознайомитися перед застосуванням засобу Іновокс Експрес з апельсиновим смаком
3. Особливості застосування препарату Іновокс Експрес з апельсиновим смаком
4. Можливі побічні реакції
5. Умови зберігання препарату Іновокс Експрес з апельсиновим смаком
6. Вміст упаковки та інша інформація

1. Фармакологічні властивості та показання для застосування препарату Іновокс Експрес з апельсиновим смаком

Іновокс Експрес з апельсиновим смаком містить антисептики – амілметакрезол і 2,4-дихлорбензиловий спирт та місцевий анестетик для горла – лідокаїну гідрохлорид. Препарат показаний для місцевого антисептичного лікування запалення (почервоніння, набряку) горла та ротової порожнини, а також для полегшення симптомів болю у горлі при цих станах.

Полегшує симптоми болю в горлі.

Іновокс Експрес з апельсиновим смаком призначений для дорослих та підлітків старших за 12 років.

Якщо через 2 дні не настає покращення, або пацієнт відчуває погіршення, зверніться до лікаря.

2. Важлива інформація, з якою слід ознайомитися перед застосуванням засобу Іновокс Експрес з апельсиновим смаком

Протипоказання щодо застосування препарату Іновокс Експрес з апельсиновим смаком

- Якщо у вас алергія на лідокаїну гідрохлорид або інші амідні місцеві анестетики, амілметакрезол, 2,4-дихлорбензиловий спирт або будь-які інші інгредієнти цього препарату (перелічені в пункті 6).
- Цей препарат не слід застосовувати дітям віком до 12 років.

Попередження та заходи безпеки

Порадьтеся зі своїм лікарем, фармацевтом або медсестрою перед використанням Іновокс Експрес з апельсиновим смаком.

Будь ласка, повідомте свого лікаря, якщо:

- у вас астма,
- симптоми не зменшуються через 2 дні застосування або якщо у вас з'являється лихоманка, головний біль, нудота, блювота або висипання на шкірі.

Препарат може бути шкідливим для зубів.

- Анестетики в цьому препараті можуть стати причиною захлинання (кашлю під час їжі або відчуття задухи) під час їжі. Не слід їсти відразу після застосування препарату.
- Препарат може викликати оніміння язика і збільшити ризик вкусити себе. Тому будьте обережні під час вживання гарячої їжі та напоїв.
- Тривале застосування (більше 5 днів) не рекомендується, оскільки воно може змінити природну флору в горлі.
- Дотримуйтесь рекомендованого дозування: при прийомі у високих дозах або протягом тривалого часу препарат може впливати на серце або нервову систему та викликати судом.
- Особи похилого віку або ослаблені особи більш чутливі до можливих побічних ефектів і повинні проконсультуватися з лікарем, перш ніж приймати цей препарат.
- Препарат не можна використовувати, якщо в роті та горлі є значні незагоєні рани.

Діти та молодь

Не рекомендується застосування засобу дітям віком до 12 років.

Препарат Іновокс Експрес з апельсиновим смаком та взаємодія з іншими ліками

Повідомте лікаря або фармацевта про всі препарати, які приймає або нещодавно приймав пацієнт, а також про препарати, які пацієнт збирається приймати.

Зокрема, повідомте свого лікаря або фармацевта, якщо ви приймаєте будь-які із перерахованих нижче ліків, оскільки може знадобитися коригування дози:

- бета-блокатори (застосовуються для лікування серцевої недостатності або захворювання артерій) або препарати, що містять циметидин (застосовуються для лікування виразки шлунка),
- інші місцеві анестетики (амідні),
- препарати для лікування серцевих захворювань, такі як мексилетин або прокаїнамід,
- препарати, такі як флувоксамін (використовується для лікування депресії),
- антибіотики, такі як еритроміцин або ітраконазол.

Хоча не повинна виникнути жодна взаємодія, не приймайте інші орофарингеальні антисептики під час використання Іновокс Експрес з апельсиновим смаком.

Застосування препарату Іновокс Експрес з апельсиновим смаком з їжею, напоями та алкоголем

Не слід приймати цей препарат перед вживанням їжі або напоїв.

Вагітність і період годування груддю

Вагітність:

Не рекомендується приймати цей препарат у період вагітності.

Годування груддю:

Не рекомендується приймати цей препарат у період годування груддю.

Керування транспортними засобами та експлуатація інших механізмів

Цей препарат, який застосовується в рекомендованих дозах, не має впливу або має незначний вплив на здатність керувати автомобілем та іншими механізмами.

Препарат Іновокс Експрес з апельсиновим смаком містить глюкозу та сахарозу.

В одному льодянику міститься 1,016 г глюкози та 1,495 г сахарози. Це слід враховувати хворим на цукровий діабет. Якщо у вас була діагностована непереносимість деяких цукрів, проконсультуйтеся з лікарем перед прийомом препарату.

Препарат Іновокс Експрес з апельсиновим смаком містить натрій.

Препарат містить менше 1 ммоль (23 мг) натрію у кожному льодянику, тобто вважається, що препарат «не містить натрію».

Препарат Іновокс Експрес з апельсиновим смаком містить терпени, що містяться в левоментолі. Занадто високі дози терпенів можуть призвести до неврологічних ускладнень, таких як судоми у дітей.

Препарат Іновокс Експрес з апельсиновим смаком містить барвники «жовтий захід» та червоний кошєніль. Засіб може викликати алергічну реакцію.

3. Особливості застосування препарату Іновокс Експрес з апельсиновим смаком

Дотримуйтеся вказівок, що містяться в цій інструкції. Завжди приймайте цей препарат згідно із вказівками лікаря або фармацевта. У разі виникнення будь-яких сумнівів, зверніться до лікаря або фармацевта.

Рекомендовані дози

– Дорослі та підлітки віком від 12 років: повільно розсмоктувати по одному льодянику в роті кожні 2-3 години; використовувати до 8 льодяників на 24 години для дорослих (максимум 4 льодяники для підлітків).

Не кладіть льодяник між яснами і шокою.

Якщо через 2 дні не настає покращення або пацієнт відчуває погіршення, зверніться до лікаря. Не рекомендується використовувати цей препарат понад 5 днів, оскільки він може змінити природну флору в горлі.

Застосування у дітей

Не застосовуйте засіб дітям віком до 12 років.

Передозування препаратом Іновокс Експрес з апельсиновим смаком

Симптоми, які можуть виникнути у разі неправильного застосування або передозування: надмірна анестезія верхніх відділів шлунково-кишкового тракту та дихальних шляхів, безсоння, неспокій, збудження, пригнічення дихання. Також може виникнути метгемоглобінемія, симптоми якої можуть включати задишку, головний біль, втому, непереносимість фізичних навантажень, запаморочення та втрату свідомості. негайно зверніться до лікаря або до токсикологічного відділення, повідомивши їм назву ліків і дозу, яку ви прийняли.

Якщо у вас виникли додаткові запитання щодо застосування цього засобу, зверніться до свого лікаря, фармацевта або медсестри.

4. Можливі побічні реакції

Як і всі лікарські препарати, цей засіб може викликати побічні реакції, хоча вони виникають не у всіх.

Під час застосування препарату з комбінацією діючих речовин у цьому препараті повідомлялося про наступні побічні ефекти:

Припиніть приймати Іновокс Експрес з апельсиновим смаком та негайно зверніться до лікаря, якщо у вас з'являться такі симптоми ангіоневротичного набряку, як:

- набряк обличчя, язика або горла,
- проблеми з ковтанням,
- кропив'янка та утруднене дихання.

Рідко (можуть виникати рідше, ніж в 1 з 1000 пацієнтів): реакції гіперчутливості (печіння, свербіж), ангіоневротичний набряк, відчуття печіння в горлі та неприємний смак.

Повідомлення про побічні реакції:

Якщо у Вас виникли будь-які побічні ефекти, зокрема будь-які побічні ефекти, не зазначені в цій інструкції, зверніться до лікаря, фармацевта або медсестри. Про побічні реакції можна повідомити безпосередньо Департаменту моніторингу побічних ефектів медичних препаратів Управління з реєстрації лікарських засобів, виробів медичного призначення та біоцидних препаратів

Ал. Єрозолимські, 181С, 02-222 Варшава,

Тел: + 48 22 49 21 301, Факс: + 48 22 49 21 309

Веб-сайт: <https://smz.ezdrowie.gov.pl>

Про побічні реакції також можна повідомити відповідальному суб'єкту.

Завдяки повідомленню про побічні реакції можна буде отримати більше інформації про безпеку застосування цього лікарського засобу.

5. Умови зберігання препарату Іновокс Експрес з апельсиновим смаком

Зберігайте препарат у недоступному для дітей місці і поза полем зору дітей.

Не використовуйте цей засіб після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці після аббревіатури «EXP». Термін придатності означає останній день зазначеного місяця.

Не зберігайте при температурі понад 30°C.

Лікарські засоби не слід викидати до каналізації або у контейнери для побутових відходів. Запитайте свого фармацевта, яким чином можна утилізувати ліки, які більше не потрібні. Таке поводження допоможе захистити навколишнє середовище.

6. Вміст упаковки та інша інформація

Склад препарату Іновокс Експрес з апельсиновим смаком:

Діючі речовини: лідокаїну гідрохлорид, амілметакрезол, 2,4-дихлорбензиловий спирт.

Кожен льодяник містить:

Лідокаїну гідрохлориду моногідрату 2 мг, 2 мг,

Амілметакрезол 0,6 мг,

2,4-дихлорбензиловий спирт 1,2 мг.

Допоміжні речовини:

Левоментол,

Сахарин натрію (E 954),

Сахароза,

Рідка глюкоза,

Жовтий «захід сонця» (E 110),

Кошеніль червоний (E 124),

Кислота лимонна моногідрат (Е 330),
Апельсиновий аромат.

Лікарська форма Іновокс Експрес з апельсиновим смаком та вміст упаковки

Іновокс Експрес з апельсиновим смаком – це двоопуклі, циліндричні ледяники помаранчевого кольору діаметром 19 мм, зі смаком апельсина.

Ледяники упаковані в блістери з ПВХ/ПВДХ/алюмінію.

Упаковка містить 12, 24 або 36 ледяників.

Відповідальний суб'єкт:

US Pharmacia sp. z o.o. вул. Зембіцька, 40, 50-507 Вроцлав.

Виробник:

LOZY'S PHARMACEUTICALS S.L.
Campus Empresarial s/n,
31795 Lekaroz Navarra, Іспанія

US Pharmacia Sp. z o.o.,
вул. Зембіцька, 40,
50-507 Вроцлав

Для отримання детальнішої інформації слід звернутися до:

USP Zdrowie sp.z o.o., вул. Полечкі, 35, 02-822 Варшава, тел.+48 (22) 543 60 00.

Цей лікарський засіб дозволено для продажу в країнах-членах Європейської економічної зони під такими назвами:

Польща: INOVOX Express smak pomarańczowy
Болгарія: INOVOX Express orange flavor
Литва: Inovox orange 2 mg / 0,6 mg /1,2 mg kietosios pastiles

Дата останнього оновлення інструкції: липень 2022